

# Strana 238

## LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ

opravte si, prosím, označený výraz - správné znění:

### Nohy jasně červené.

238

#### Dudek chocholatý *Upupa epops*

tH4-5/P  
V 25-29 cm (včetně zobáku dl. 4-5 cm), RK 44-48 cm. Hnízdí v zemědělských oblastech a otevřené, travnaté krajině s lesky, živými ploty a krovinami; často je pozorován ve vinohradech a sadech. Letní výskyt (většinou konec IV.-IX.), zimuje v Africe. V ČR pravidelně hnízdí a protahuje. Většinu času tráví na zemi, potravu hledá v nízké trávě nebo na holých místech (žíví se hlavně červy a hmyzem). Ostražitý (ale ne přímo plachý), od člověka si udržuje určitou vzdálenost. Hnízdí ve stromové dutině, kamenných stěnách, budkách nebo v základech domů.

**URČOVÁNÍ** Jeden z nejnápadnějších a nejhezčích ptáků celé uvažované oblasti: *žlutohnědý růžový s černými a bílými pruhy*, *široce zakulacenými křídly* a vztýčitelnou *chocholkou* na temeni podobnou čelence *indiánského náčelníka* ( kterou obvykle zvedá jen na okamžik při přistání, jindy vzácně ). Zobák dlouhý, úzký, měrně ohnutý. Ocás černý s širokým bílým pruhem. Létá kolébavě a dost vracejí krátkých vlnkách, s náznaky plachtění, v nepravidelném rytmu a často nízko nad zemí. Na zemi se pohybuje čile a trhavě, jako špaek.

**HLAS** Při vzrušení vysoké, hlučné „ší“ ve stylu hrdlicky zahradní nebo vzdáleného racka chechtavého. Při krmení partnera nebo mláďat na hnízdě také ostré opakování „čerr“, podobně i v jiných situacích. V toku tříslabiéně, duté a tlumené „hu-pu-pu“ ( „du-du-du“ ), několikrát opakování; zblízka slabé, ale daleko se nesoucí.

#### LEDŇÁČKOVITÍ *Alcedinidae*

Malí nebo středně velcí, kompaktní ptáci s poměrně velkou hlavou a zobákem, krátkým krkem a nohami. Většinou u vody, jsou přizpůsobeni lovу ryb, při němž se vrhají do vody a potápějí se.

#### Ledňáček říční *Alcedo atthis*

sII4  
V 17-19,5 cm (vč. zobáku dl. asi 4 cm). Žije u malých a středně velkých pomalu tekoucích řek bohatých na ryby, se stromy a břehy vhodnými k hnizdění; někdy u jezer; v zimě také v ústí řek a na pobřeží. Sedí nehybně a vyhlíží malé rybky, které následně loví kolmým pádem do vody a potopením. Někdy se při hledání kořisti třepetá na místě. Poměrně plachý a neklidný. Výhrabává hnízdí nory v písčených březích, ve kterých jsou mláďata vychovávána na podkladu z nahromaděných rybich kostí.

**URČOVÁNÍ** Malý, *zaváhalitý*, s *krátkým ocasem* a *nohami*, *velkou hlavou* a *neúměrně dlouhým zobákem*. Sedí vzpřímeně. Nádherně zářivě zbarvený: *temeno a křídla zelenomodré* ( z některé-

cího páru má žlutý černý zobák a ♀ červenavý kořen dolního čelisti ). **Nohy hnědavé.** – Juvenilní: Jako ad., ale peří je trochu matnější a do zelenat. Nohy šedavé.

**HLAS** Obyčejně se ozývá v letu krátkým, ostrým hvízdnutím „zí“, někdy s další slabikou „zí-tí“; při vzrušení opakován v krátkých sériích. Zpěv, který je slyšet velmi zřídka, je tvoren jednoduchými rádami tónů podobných předchozím a je pronášen v trhavém, nepravidelném rytmu.

#### Ledňáček hnědohlavý *Halcyon smyrnensis*

V 26-30 cm (vč. zobáku dl. asi 6 cm). Na rozdíl od přibuzných druhů není přísně vázaný na vodu, může být spatřen i mezi stromy v sušších zemědělských oblastech, v palmových hájích a v městských parcích, někdy i v lese s nevelkými pasekami. Obyčejně ale blízko vody. Loví ryby, obojživelníky, ještěrky a hmyz.

**URČOVÁNÍ** Velikost většího drozda. Živí zbarvení ho činí nezaměnitelným. Hlava, břicho, boky a malé křídelní krovky kaštanově hnědé, *hrdlo a horní část hrudi čistě bílé*, *krk, vorní strana ocasu a převážně i křídla modrozelené*. **Zobák korálově rudý**. V letu mu září blankytově modré skvrny na svrchní straně ručních letek a *zespojem velká bílá křídelní pole*. – Juvenilní: O něco matnější, na bílé hrudi často jemně tmavé vlnkování. Zobák žlutohnědý nebo oranžový s tmavší špičkou.

**HLAS** *Hlučností a hlasitostí* dominuje místu svého výskytu. Po-plašné skřehotavé, kovově znějící „krix krix krix-ix...“. V toku velmi hlasité a opakování rychlé trylkovité hvízdání, s klesající výškou, které zní rozhořčeně a bečiv, „**ti-ti-tü-tü-tu-tu...**“ a je často pronášeno z vrcholku vysokého blahovičníku.

#### Rybářík pruhoprsý *Megacyrle alcyon*

V 31-34 cm. Velmi vzácný zatoulanc ze S Ameriky.

**URČOVÁNÍ** Velký a mohutný. *Svrchní obočové sedí s bílým obojkem*. Hrud bílá buď s šedým ( ♂ ) nebo s *šedým a rezavým* pruhem ( ♀ ). Prodložená pera temene a sije mohou být vytvářena a tvořit tak *střapatu chocholku*.

#### Rybářík jižní *Ceryle rudis*

V 25-27 cm (včetně zobáku dl. asi 5 cm). Hnízdí u řek, jezer, v ústích řek, u kanálů a rybníků; také na pobřeží, kde ho lze spatřit, jak se třepetá dost daleko od břehu nad příbojem. Stály.

**URČOVÁNÍ** Velký a čílý. Třepotá se a odpočívá na otevřených místech, kde je dobré vidět. Peří je pouze *černobílé*. Spodní strana těla bílá, ♂ má dva černé pruhy přes hrud' a ♀ jeden.