


opravte si, prosím, označený titulek - správné znění:

Plameňák malý

424 DRUHY INTRODUKOVANÉ A UNIKLÉ ZE ZAJETÍ



Plameňák americký

Plameňák chilský

ad.

Hrdlička chechtavá

ko

o

Alexandr malý

Plameňák americký *Phoenicopterus ruber*

[V****]

V 125-145cm, RK 140-170cm. Žije ve Stř. Americe. Několik výskytnů z Evropy, ale s největší pravděpodobností se jedná o úniky ze zajetí, kde je často chován. – Větší, jako plameňák růžový. Opeření se liší *sytlejším a rozsáhlejším růžovočerveným zbarvením*. Množství červené je proměnlivé v závislosti na věku a potravě, někteří ptáci jsou téměř tak světlí jako plameňák růžový, jiní mají *nápadně červenou hlavu, krk, hrud a ocas*. Nohy šedavé s trochou růžové na „kolenou“ (mnohem menší kontrast než u plameňáka chilského), zobák jako u p. růžového, ale často *sytlejší růžový*. (Bez ilustrace)

Plameňák malý *Phoenicopterus minor*

V 80-90cm, RK 90-110cm. Žije ve stř. a V Africe. Několik záznamů pochází z Francie, Maroka a Španělska, v některých případech jde o divoké ptáky. V roce 1904 se jeden pár pokusil zahrnout v Camargue, ve Francii, což se opakovalo i v nedávné době. Početná pozorování pocházejí také ze S Evropy, ale zde se pravděpodobně jedná o úniky ze zajetí. – Malý. Peří růžové s červenými pruhy na hřbetě a ramenou. *Nohy celé červené, zobák sytě rudý s malou černou špičkou*.

Plameňák chilský *Phoenicopterus chilensis*

[V****]

V 100-120cm, RK 120-135cm. Jihoamerický druh držený v několika chovech v Británii a Evropě, setkat se můžeme i s volně létajícími jedinci. Zdivočelá populace je známá z Německa. – O trochu menší než plameňák růžový, *více než polovinu zobáku má černou, nohy jsou béžovošedé s kontrastními červenými „koleny“ a prsty, peří má často růžovější nádech*.

Hrdlička chechtavá *Streptopelia risoria* (domest.)

V 27-29cm. Již dávno zlomácnělá forma africké hrdličky chechtavé (str. 414), někdy je považována za samostatný druh. Několik párů hnízdících na Tenerife na Kanárských ostrovech pochází z ptáků uniklých ze zajetí. – Velmi podobná hrdličce zahradní, ale *menší, má o něco kratší ocas, světlejší béžově šedobílé opeření a téměř bílé břicho* (u hrdličky zahradní světle šedé). Černá kresba po stranách krku je často širší a více zakulacená, tvoří tak *úzký příčný proužek*. Je také nepatrně menší a světlejší než její původní divoká forma. *Ozývá se příjemným, několikrát opakovaným „ko kr rrr“*.

Alexandr malý *Psittacula krameri*

V 27-43cm (včetně prodlouženého ocasu dlouhého u ad. 18-23 cm). Druh J Asie a subsaharské Afriky, v uvažované oblasti introdukovaný nebo uniklý ze zajetí, v několika zemích nyní žije zdivočelá, někdy celkem početná populace (Belgie, Británie, Egypt, Francie, Německo, Řecko, Izrael, Nizozemsko, Španělsko, snad i jinde). – *Téměř celý jasně zelený, má dlouhý špičatý ocas a dlouhá úzká křídla s tmavšími letkami. Horní čelisti růžově červená. ♂ má černý podbradek a úzký černý proužek příčně po stranách hrda, který přechází v růžově červený obojek přes krk a šíji; ♀ má jednotvárně zelenou hlavu a krk. Světlé oči s červeným očníovým kroužkem. Je hluboký a čilý, drží se vysoko v korunách vysokých stromů velkých parků, i ve městech*.

Alexandr velký *Psittacula eupatria*

V 50-62 cm. Jihoasijský druh žijící v Indii a dále na východ. Malá populace pocházející z uprchlých ptáků žije v Belgii, Německu, Nizozemsku a Turecku (Istanbul). – *Jako velká verze alexandra malého, má téměř dvojnásobnou velikost, dlouhá zelená křídla a dlouhý špičatý zobák, bez ohledu na velikost se pozná podle mnohem mohutnějšího červeného zobáku a rezavých „ramenních skvrn“ (načervenalá vnitřní část „paže“)*. (Bez ilustrace)

Agapornis Fischerův *Agapornis fischeri*

V 14-16 cm. Východoafrický druh. Zdivočelá populace žije ve Francii a šíří se. – *Poměrně malý, kompaktní papoušek s úměrně velkou, kulatou hlavou a krátkým ocasem. Snadno se pozná podle zeleného těla, oranžové hlavy a žluté hrudi. Mohutný zobák je celý červený. Tmavě okolí oka a široký bílý oční kroužek*. (Bez ilustrace)